



Kastration Hündin

Die Entscheidung, ob die eigene Hündin kastriert werden soll oder nicht, ist eine wichtige Frage und sollte mit Ihrem Tierarzt besprochen werden. Eine kurze Zusammenfassung, was diese Operation für Sie und besonders für Ihr Tier bedeutet, soll Ihnen bei der Entscheidung helfen:

Eine nicht kastrierte Hündin wird je nach Rasse mit 7-10 Monaten das erste Mal läufig und kommt danach, auch wieder in Abhängigkeit von der Rasse, alle 6-10 Monate in eine neue Läufigkeit. In der ca. 3 Wochen dauernden Läufigkeit ist die Hündin für Rüden interessant und kann unerwünscht gedeckt werden. Während der Läufigkeit findet eine Blutung statt, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann.

Ca. 4-6 Wochen nach der Läufigkeit entsteht bei jeder Hündin die sogenannte Scheinschwangerschaft. Das hängt mit den während der Läufigkeit gebildeten Hormonen zusammen. Wie stark sich diese Scheinschwangerschaft zeigt, ist von Hund zu Hund unterschiedlich. Bei einer stark ausgeprägten Scheinschwangerschaft zeigt die Hündin Wesensveränderungen (Nestbau, Suchen nach Welpenersatz) und bildet Milch an. Dies kann zu Entzündungen der Milchdrüsen führen. Bei Hündinnen, die eine stark ausgeprägte Scheinschwangerschaft zeigen, sollte daher unbedingt über eine Kastration nachgedacht werden.

Das Risiko, an Mamma-Tumoren zu erkranken, ist für unkastrierte Hündinnen um ein Vielfaches höher, da diese Tumoren vor allem durch Hormone ausgelöst werden. Die häufig diskutierte Frage, wann der richtige Zeitpunkt für eine Kastration ist, kann durch eine Studie der Universität Gießen (Prof. Dr. Kramer) in Bezug auf die Entstehung der Mamma-Tumore beantwortet werden:

Eine frühe Kastration senkt das Risiko der Entstehung von Mamma-tumoren. Die unkastrierte Hündin hat ein absolutes Erkrankungs-Risiko von 0,2-1,86 % (3,5%). Wird jedoch vor der

1. Läufigkeit kastriert, sinkt das absolute Risiko auf 0,001 – 0,0093% ab. Mit jeder Hitze fällt die kastrationsbedingte Risikosenkung geringer aus. Nach der 3. Läufigkeit hat die Kastration keinen minimierenden Effekt mehr.

Ein weiterer positiver Aspekt der Kastration besteht darin, dass die Hündin nicht mehr an einer Gebärmutterentzündung (Pyometra) erkranken kann. Diese kommt bei älteren Tieren nicht selten vor und kann bei längerem Bestehen auch lebensbedrohliche Folgen haben. In den meisten Fällen hat dies immer eine aufwändige Operation zur Folge.

Ein Eingriff in den Hormonhaushalt, wie es die Kastration darstellt, kann aber auch zu unerwünschten Nebenwirkungen führen, die nicht unerwähnt bleiben sollten:

Es kann bei Hunden mit längerem seidigem Haar (z.B. Afghane, Bearded Collie, Langhaardackel) zu einer Veränderung des Haarkleides führen. Die Hündinnen bekommen dann ein sogenanntes „Welpenfell“, welches weicher und dicker ist.



Eine weitere Problematik, die bei kastrierten Hündinnen aber auch Rüden bekannt ist, ist die Leichtfuttrigkeit. Durch den Wegfall der Hormone kommt es zu einem verlangsamten Stoffwechsel, wodurch es sein kann, dass die Hunde bei gleichbleibender Futtermenge an Gewicht zunehmen, da sie einen geringeren Verbrauch an Kalorien haben. Dem kann aber sehr leicht durch weniger Futter oder mehr Bewegung entgegengewirkt werden.

In einigen Fällen kommt es durch die Kastration zu einer Schwächung des Blasenmuskels, was bei älter werdenden Hündinnen zu der sogenannten Inkontinenz (Harnträufeln) führen kann. Diese ist jedoch mit Medikamenten gut zu behandeln.

Abschließend kann man sagen, dass eine Kastration medizinische Vorteile hat. Auch das Zusammenleben mit einer kastrierten Hündin ist für viele Besitzer „einfacher“ (nicht Aufpassen müssen, hygienischer Aspekt). Aber es gibt eben auch ein paar Nachteile, so dass jeder Besitzer für sich entscheiden sollte, was für ihn und seinen Hund das Beste ist.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Das Team des Tiergesundheitszentrums Overath